Les
Rencontres ↙
de l'Inra ↗

Le bouclage des cycles dans les systèmes de production en Agriculture Biologique

25 février 2019 / de 10h05 à 10h25

Le bouclage des cycles biogéochimiques, un enjeu pour les systèmes de production en Agriculture Biologique

- Un principe fixé par l'IFOAM : appui sur les processus écologiques, et sur les ressources locales
- Un enjeu d'autonomie, motivé par des raisons économiques

Concrètement, le bouclage des cycles doit se faire

- En valorisant les processus écologiques (fixation, mycorhization)
- Par recyclage des ressources organiques
- Sans recours aux engrais de synthèse

Un bouclage des cycles remis en question par le développement de l'AB

- Augmentation de la demande en matières fertilisantes organiques, sans augmentation correspondante de l'offre en matières fertilisantes issues de l'Agriculture Biologique
- "Conventionnalisation" de l'AB : en 2011, 66% des fermes AB étaient sans élevage

Dans quelle mesure le développement de l'AB peut-il compromettre la capacité à boucler les cycles des éléments fertilisants ?

Quelles sont les stratégies actuellement utilisées par les fermes en AB pour s'approvisionner en éléments ?

Une réponse apportée par l'observation des stratégies d'approvisionnement des fermes en AB

**Région
diversifiée**
0.6 UGB/ha
(n=17)

**Région
d'élevage**
1.2 UGB/ha
(n=21)

Légende

- Zones urbaines et industrielles
- Terres arables
- Cultures permanentes
- Prairies
- Systèmes culturaux et parcellaires complexes
- Forêts
- Pelouses et pâturages naturels
- Tourbières
- Cours et plans d'eau

**Région de
culture**
0.2 UGB/ha
(n=25)

0 10 km

Une réponse apportée par l'observation des stratégies

- n=63 fermes en AB
- Enquêtes sur les pratiques d'importation / exportation de matières
- Quelles sont les sources de N et P entrant dans les fermes ?
 - Fixation symbiotique
 - Fermes biologiques
 - Fermes conventionnelles
 - Origine urbaine
 - Roches phosphatées

Légende

- Zones ur
- Terres ar
- Cultures
- Prairies
- Système
- Forêts
- Pelouses et pâturages naturels
- Tourbières
- Cours et plans d'eau

(n=25)

0 10 km

05

Des systèmes de production en AB partiellement autonomes

- Compost urbain
- Roches phosphatées
- Agriculture Conventiennelle**
- Agriculture Biologique
- Fixation + déposition atmosphérique

- Une large fraction des éléments minéraux entrant dans les fermes AB provient de fermes conventionnelles
- Cette importation est moindre pour N que pour P

Des possibilités de bouclage des cycles qui dépendent de la diversité des productions dans les territoires

Spécialisé cultures

Diversifié

Spécialisé élevage

- Ferme AB enquêtée
- Autre ferme
- Flux de matière
- Boucle de recyclage

	Autonomie locale (%)		Indice de recyclage (%)	
	N	P	N	P
Spécialisé cultures	69	39	0	0
Diversifié	85	52	5	20
Spécialisé élevage	80	13	0	0

(Nowak et al. Agric, Ecosyst & Environ, 2015)

Quelles conséquences du développement de l'AB pour le bouclage des cycles ?

- Une raréfaction des sources issues de l'agriculture conventionnelle
- Une compétition accrue pour les ressources fertilisantes, les fermes AB agissant comme des puits de matières organiques fertilisantes
- Une compétition accrue par les moindres rendements en AB
 - Pour la production de résidus de culture
 - Exacerbant les compétitions entre humains et animaux pour l'usage des ressources végétales

- Ferme en AB
- Autre ferme
- ➔ Flux de matière

Une approche fondée sur l'exploration de scénarios à base de modèles

Élaboration d'un modèle spatialement explicite (maille de 10 x 10 km à l'équateur) simulant

- Les entrées et sorties de N dans les sols cultivés (61 espèces)
- Tenant compte de la boucle de recyclage cultures-élevages
- Tenant compte des sources possibles externes
 - Effluents d'élevage conventionnels
 - Effluents urbains

Une approche fondée sur l'exploration de scénarios à base de modèles

Introduction d'une courbe de réponse du rendement des cultures à l'azote

Prise en compte du changement d'occupation des sols cultivés en AB

En partant de la distribution
actuelle des cultures

Et en tenant compte des différences de rotations
culturales entre systèmes conventionnels vs en AB

*Différences de fréquence d'occurrence des cultures en
AB moins agric. conventionnelle*

(Barbieri et al., Scientific Reports, 2017)

Le développement de l'AB pourra conduire à des changements profonds de l'usage des terres cultivées

- Diminution de 30 % des surfaces cultivées en céréales à l'échelle mondiale
- Augmentation de 60 % des surfaces cultivées en prairies temporaires
- Des réponses des surfaces en légumineuses variant selon les zones géographiques

Différence de surfaces cultivées (en ha par maille) entre les scénarios 100 % AB moins 100 % conventionnel

Un rôle important joué par les animaux d'élevage

Prise en charge de la contribution spécifique des élevages, en accord avec les cahiers des charges de l'AB

- Alimentation locale, d'origine AB
- Effluents difficilement transportables

→ Démarche d'optimisation des effectifs animaux à l'échelle de la maille, pour maximiser la production alimentaire

Des résultats encore en cours d'acquisition qui suggèrent...

- Un rôle important joué par les prairies (temporaires et permanentes)
- Un rôle majeur joué par l'élevage
 - Notamment de ruminants
 - À condition de relocaliser les animaux dans les régions de culture
- La disponibilité en N comme un facteur pouvant limiter le développement de l'AB

En conclusion

- Un enjeu réel autour de la disponibilité en N (et en P ?) pour la durabilité et le développement des systèmes en AB !
- Des modifications profondes des systèmes de production (notamment d'élevage) qui seront requises pour répondre à cet enjeu

An abstract graphic on the left side of the slide, composed of numerous small green dots that form a swirling, tunnel-like shape. Two small white arrows point towards the center of this shape from the right.

Merci
pour votre attention